

* 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
첨부문서 작성일자: 2022년 11월 16일

BORYUNG



소화불량과 속쓰림을 동시에!

겔포스 **엘**®
현탁액

MULTI CARE

소화불량 | 위부팽만감 | 속쓰림

일반의약품
품목기준코드:
201708580

원료약품 및 그 분량	100g 중
유효성분	인산알루미늄겔(EP) 12.5g 수산화마그네슘(KP) 2g 시메티콘(USP) 0.225g DL-카르니틴염산염(KP) 0.75g
첨가제 [보존제]	클로르헥시딘아세트산염 0.015g
첨가제	바나나믹스향B-17026, 백당, 수크랄로스, 잔탄검, 정제수, 펙틴, 한천, 황산칼슘
성상	알루미늄 필름에 들어있는 흰색 - 담백색의 현탁액
효능·효과	위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식
용법·용량	만15세 이상 1일 1~3회 1포(20g) 식간[식사때와 식사때 사이에] 복용합니다. 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 만 3개월 미만의 젖먹이에게 투여하지 않습니다. 또 만 3개월 이상이라도 만 1세 미만의 젖먹이는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고 복용시키지 않는 것이 바람직합니다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오. 테트라사이클린계 항생제 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 1) 신장장애 환자 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

- ☑ 위장관운동 활성 성분인 DL-카르니틴염산염이 첨가되어, 더부룩함 개선
- ☑ 복부의 과도한 가스를 분산시켜 위부팽만감 해소
- ☑ 복합처방에 의한 우수한 제산력과 위벽보호 효과

사용상의 주의사항

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
- 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법-용량을 잘 지키십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 기밀하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

1포(20g) X 4, 1포(20g) X 6

※ 만약 구입 당시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.

※ 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일 기관(14-3330/1644-6223)에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8088

첨부문서 작성일자 : 2022년 11월 16일

제조 및 판매자 : (주)보령 경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109

BORYUNG