

* 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
첨부문서 작성일자 : 2024년 7월 26일

BORYUNG

속쓰림과 위벽보호를 빠르게!

겔포스[®] 엠[®]
현탁액

COATING EFFECT

속쓰림 | 위염 | 위산과다

일반 의약품

품목기준코드:
199400883

원료약품 및
그 분량

100g 중

유효성분

인산알루미늄겔(EP) (인산알루미늄으로서 12.38g) 61.9g
수산화마그네슘(KP) (마그네슘으로서 833.5mg) 2.0g
시메티콘(USP) 0.2g

첨가제 [보존제]

메틸파라벤 0.08g 프로필파라벤 0.02g

기타 첨가제

백당, 오렌지에센스, 잔탄검, 정제수, 펙틴, 한천, 황산칼슘

성상

이 약은 흰색 - 담백색의 겔로서 물로 희석(물게 함)하면 곧 균질의 현탁액이 된 다음 서서히 침강합니다.(가라앉습니다.)

효능·효과

위산과다(위염, 위·십이지장궤양에 관련된 것도 포함), 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림

용법·용량

성인 1회 1포, 1일 3회 식간[식사때와 식사때 사이] 및 취침시 복용합니다.
복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

사용상의
주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
이 약은 3개월 미만의 영아(갓난아기)에게는 복용시키지 마십시오. 또 3개월 이상이라도 1세 미만의 영아(갓난아기)에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 마십시오.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
테트라사이클린계 항생제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 신장장애(신장장애) 환자
2) 의사의 치료를 받고 있는 사람 또는 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상담시 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
2) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

BORYUNG



속쓰림과 위벽보호를 빠르게!

겔포스[®] 엠[®]
현탁액

COATING EFFECT

속쓰림 | 위염 | 위산과다

일반 의약품
품목기준코드:
199400883

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
 - 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

4포/상자(1포(20g)X4), 6포/상자(1포(20g)X6)

- ※ 만약 구입 당시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일기관(14-3330/1644-6223)에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8088

첨부문서 작성일자 : 2024년 7월 26일

제조 및 판매자 : (주)보령 경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109

BORYUNG